



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



Εθνικός
Οργανισμός
Παροχής
Υπηρεσιών
Υγείας

Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η

**ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ**

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ: Παρακολούθησης και Αξιοποίησης Ελέγχων

Πληροφορίες: Ν.Οικονόμου

Τηλ.: 210 8110667

FAX: 210 8110694

Ταχ.Δ/ση: Κηφισίας 39,151 23

E-mail: d6@eopyy.gov.gr

Αθήνα 16-1-2014

Αριθμ. πρωτ:οικ.1515

ΠΡΟΣ

- 1.Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ
- 2.Περιφερειακές Υπηρεσίες ΕΟΠΥΥ
3. Δ/ση Φαρμάκου-φαρμακεία ΕΟΠΥΥ
- 4.ΚΜΕΣ
- 5.ΗΔΙΚΑ
- 6.Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
- 7.Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τη συνταγογράφηση αντιγριπικών εμβολίων από αγροτικούς ιατρούς»

- Σχετικά:1.Το υπ'αριθμ.πρωτ. 34063/23-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Σχεδιασμού
2.Το υπ'αριθμ.πρωτ.33473/18-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Φαρμάκου

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων, με θέμα την εφαρμογή αντιγριπικού εμβολιασμού για την εποχική γρίπη σας γνωρίζουμε ότι:

1.προκειμένου ο εμβολιασμός με το αντιγριπικό εμβόλιο, να εφαρμοσθεί σωστά και έγκαιρα στα πλαίσια της καθορισμένης εμβολιαστικής περιόδου, σε ακριτικές, νησιωτικές περιοχές όπου υπάρχουν προβλήματα από την άνιση κατανομή του ιατρικού προσωπικού και μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις από Νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας ή Μονάδες Υγείας ΕΟΠΥΥ, μπορούν να συνταγογραφούν τα αντιγριπικά εμβόλια και οι αγροτικοί ιατροί.

2.Η συνταγογράφησή τους θα πρέπει να γίνεται αυστηρά για τις ομάδες υψηλού κινδύνου και σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το σχετικό (1) έγγραφο.

3. Η χορήγηση των αντιγριπικών εμβολίων πρέπει να γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις ανεπιθύμητες ενέργειες τους που χαρακτηρίζονται σαν πολύ συχνές (περισσότερες από 1 ανά 10 δόσεις του εμβολίου), συχνές (έως 1 ανά 10 δόσεις του εμβολίου) όχι συχνές (έως 1 ανά 100 δόσεις του εμβολίου) και σπάνιες (έως 1 ανά 1000 δόσεις του εμβολίου) και

αναφέρονται στο φύλλο οδηγιών του κάθε εμβολίου.

4. Πριν από την χορήγηση του αντιγριπικού εμβολίου θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ δηλαδή

1. Τυχόν αλλεργική αντίδραση σε προηγούμενη δόση του εμβολίου.
2. Η ύπαρξη αλλεργίας σε κάποιο συστατικό του εμβολίου
3. Η ύπαρξη σοβαρής αλλεργικής αντίδρασης στο αυγό
4. Η ύπαρξη κάποιας ανοσοανεπάρκειας ή η λήψη φαρμάκων που εξασθενούν το ανοσοποιητικό σύστημα.
5. Η ύπαρξη διαταραχών του κεντρικού νευρικού συστήματος ή εξελισσόμενη νόσο του εγκεφάλου ή επιληψία που δεν ελέγχεται με τα φάρμακα.
6. Ο υψηλός πυρετός $> 38,5^{\circ} \text{C}$.
7. Προβλήματα αιμορραγίας.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Δ/ντής

Ι.ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ